

Протокол за дозиране в клинична практика

1. Базова схема

Стандартна доза	1 саше (1 g) на всеки 10 kg телесно тегло дневно
Приложение	Перорално, смесено с храна или малко вода
Кратност	Веднъж дневно; при доза над 2 сашета — разделена на два приема
Опаковка	30 сашета × 1 g

2. Дозиране по телесно тегло

до 10 kg	1 саше дневно
10 - 20 kg	2 сашета дневно
20 - 30 kg	3 сашета дневно
над 30 kg	3-4 сашета дневно по преценка

3. Продължителност по показание

След операция / инфекция	2-4 седмици
Онкологичен пациент	Продължителен прием, успоредно с основния протокол, с периодична преоценка
FIV / FeLV	Продължителен прием с преоценка на 8-12 седмици
Гериатрия / хронични състояния	Курсове от 4-8 седмици с интервали или непрекъснат прием
Стрес и профилактика	2-3 седмици около периода на натоварване

4. Начален (loading) режим

При тежко потисната имунна функция някои практики прилагат удвоена доза през първите 7-14 дни, след което се преминава към поддържаща доза. Решението се взема от лекуващия ветеринарен лекар.

5. Проследяване

Препоръчва се клинична преоценка на 4 седмици: общо състояние, апетит, тегло, поносимост към основната терапия и лабораторни показатели според основното заболяване.

6. Практически бележки

Прахът е без изразен вкус и обикновено се приема с храната. Не се изисква прием на гладно. Съхранение при стайна температура, на сухо и защитено от пряка светлина.

PetImune · Официален вносител за България · office@petimmune.eu · petimmune.eu — Материалът е с информационна цел за ветеринарни специалисти. PetImune е допълваща храна (нутрицевтик), а не ветеринарномедицински продукт.